

# Metanfetamina

## Entender el problema y cómo ayudar a las personas afectadas

Los peligros asociados con el uso de metanfetamina han cambiado significativamente. Si bien la droga es inherentemente mortal, la introducción de fentanilo ha llevado el consumo de metanfetamina al nivel de la ruleta rusa. El fentanilo y la metanfetamina han devastado comunidades en todo el país.


Las personas necesitan conocer los signos del consumo de metanfetamina, reconocer la psicosis por metanfetamina y saber cómo ayudar a alguien adicto a la metanfetamina.



## RECONOCER EL USO DE METANFETAMINA



Rascarse con frecuencia, generalmente debido a una alucinación.



Excitación extrema, confusión y cambios de humor.



Náuseas, sudoración e hipertermia.



Tembor o espasmos en el cuerpo o en el rostro.



Movimientos rápidos de los ojos, pupilas dilatadas y respiración acelerada.



Síntomas de psicosis, como paranoia, delirios y alucinaciones.



Presión arterial alta, aumento de la frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco irregular.




Hiperactividad, que puede incluir hablar en exceso, moverse en exceso y negarse a comer o dormir.

## Psicosis por Metanfetamina Y Cómo Manejarla

La psicosis por metanfetamina ocurre en aproximadamente el 40% de las personas que consumen la droga. Los síntomas de la psicosis por metanfetamina incluyen: pensamientos delirantes, comportamiento agresivo y ver, escuchar o sentir cosas que no están presentes. Las alucinaciones o delirios a menudo se desarrollan durante o después del uso de la droga o durante la abstinencia, también pueden presentarse síntomas psicóticos.

La psicosis por metanfetamina generalmente se asocia con el consumo crónico de metanfetamina. Se producen cambios en el cerebro que hacen que la persona sea más susceptible a la psicosis. Un individuo puede no tener antecedentes de episodios psicóticos y experimentar una psicosis inducida por metanfetamina. Aquí hay algunas cosas esenciales a tener en cuenta:



Mantén la calma en una situación aterradora. Permanece con la persona, habla y muévete lentamente y de manera constante para no asustarla aún más.



La estabilización en un hospital o en un entorno residencial es fundamental. Esto ayudará a evitar las autolesiones o una situación violenta.



El tratamiento es esencial y puede llevarse a cabo en un entorno hospitalario o en un centro de rehabilitación de drogas. Por lo general, el hospital será la primera opción en caso de emergencia.